

***Murexsul cevikeri* (Houart, 2000) nei mari italiani e nel Pleistocene superiore siciliano (Gastropoda, Muricidae)**

Giuseppe Bonomolo, Fabio Liberto, Agatino Reitano & Giuseppe Colamonaco

Riassunto

Si segnala il ritrovamento di *Murexsul cevikeri* (Houart, 2000) per le acque italiane, più precisamente per Santa Flavia e Cefalù (Palermo), Siracusa, Scilla (Reggio Calabria) e Gallipoli (Lecce). Questa specie era nota solo per il Mediterraneo orientale (Turchia, Cipro e Grecia) e viene qui segnalata per la prima volta per i mari italiani, mentre le citazioni per il Mar Tirreno (Sardegna) vanno riferite ad una forma particolarmente spinosa di *Muricopsis cristata* (Brocchi, 1814). *Murexsul cevikeri* viene anche riportata per il Tirreniano (Pleistocene superiore) di Capo Milazzo (Messina). Sono evidenziate ed illustrate le differenze nella conchiglia e nella colorazione esterna del mollusco tra *Muricopsis cristata* e *Murexsul cevikeri*.

Abstract

Murexsul cevikeri (Houart, 2000) is reported from several localities in Southern Italy (Palermo, Siracusa, Reggio Calabria, Lecce). These are the first records from the Italian Seas, whereas previous records from Sardinia should be referred to markedly spiny specimens of *Muricopsis cristata* (Brocchi, 1814). Before the present records, *Murexsul cevikeri* was only known from the Eastern Mediterranean (Turkey, Cyprus and Greece). It is also recorded from the Late Pleistocene (Tyrrhenian) of Capo Milazzo (NE Sicily). The differences in shell and soft parts between *Muricopsis cristata* and *Murexsul cevikeri* are pointed out.

Parole chiave

Gastropoda, Muricidae, *Muricopsis*, *Murexsul*, Mediterranean.