



**Caratteristiche peculiari per la facile classificazione di alcune specie**

<b>moolembeecki</b>		Unica specie con protoconca sculturata
<b>nivosa</b>	Unica specie priva di scultura assiale	
<b>dentata pirintella fisheri</b>		Strie spirali finissime su tutta la conchiglia
<b>doliolum jeffreysiana</b>	Assenza di scultura spirale Bande colorate sui giri (doliolum)	
<b>brusinai monterosati pellucida</b>		Base dell'ultimo giro con la <b>sola scultura spirale</b>
<b>palazzii nana</b>	Base dell'ultimo giro con scultura sia assiale che spirale	



**Caratteristiche di distribuzione geografica di alcune specie**

<b>dentata</b> <b>fisheri</b> <b>pirintella</b> <b>limitum</b> <b>nana</b>		Coste israeliane, turche, Cipro, Egitto
<b>eximia</b> <b>marthinae</b> <b>nivosa</b> <b>pellucida</b>	Mare di Alboran, coste spagnole meridionali, Gibilterra	
<b>pontica</b>		Mar Nero

**Caratteristiche batimetriche di alcune specie**

<b>flexuosa</b> <b>brattstroemi</b> <b>stefanisi</b>		Repertate solo in detriti del circalitorale profondo e batiale
--	--	--