

**Tabella riassuntiva Genere TELLINA Linnè, 1758**

Nome specifico	Autore	Dimens. (mm)	Areale	Principali caratteristiche	Colore	
					Interno	Esterno
<b>Tellina compressa</b>	Brocchi, 1814	15-23	Med. < 100 metri	rostro posteriore, linee concentriche più marcate agli estremi, nella parte posteriore linee oblique alle linee concentriche	rosa	rosa con talvolta sfumature gialle
<b>Tellina distorta</b>	Poli, 1791	15-21	Madera, Canarie, Adriatico	ovale, leggerm. beante alle estremità, superficie lucida, valva dx con rostro corrispondente a profondo solco sulla sn	bianco giallo	bianco giallo con raggi rosei più forti sul margine inferiore
<b>Tellina donacina</b>	Linnè, 1758	15-17	Adriatico, Marmara, Nero	solida, convessa; parte anteriore molto più grande. Superficie lucida all'umbone il resto opaco, lammelle concentriche tenui		
<b>Tellina fabula</b>	Gmelin, 1791	18-23	Med. <50	gracile, sottile, semitrasparente, valva dx più convessa. Superficie ornata di linee concentriche molto esili e linee di accrescimento		bianco con zone aranciate, gialle
<b>Tellina incarnata</b>	Linnè, 1758	35-40	Med. <60 metri	compressa, anteriormente ovale; valva dx con un solco che divide parte ante da post. Superficie lucida, liscia; strie concentriche lievi più marcate sulla valva sn	carne con bordi bianchi	carne, aranciato più o meno roseo
<b>Tellina nitida</b>	Poli, 1791	40	Med. litoraneo	come T. planata ma più ovale ed allungata	carne	bianco, giallo ed anche a fasce concentriche bigie o brunicce
<b>Tellina planata</b>	Linnè, 1758	50-70	Med. litoraneo	Ovale, schiacciata, anteriore più ampio e arrotondato posteriore angolato e a becco con pieghe radiali. Superficie liscia con numerosi solchi concentrici evidenti per i contrasti di colore.	carne	fondo bianco, solchi concentrici, bigi, brunicci, giallastri o aranciati in periferia con periostraco grigio
<b>Tellina pulchella</b>	Lamarck, 1818	20-32	Med. infralitorale	Allungata compressa, leggermente beante posteriormente, valva sx + convessa. Parte post leggermente + corta dell'ante e notevolmente rostrata. Superficie ornata di numerose strie concentriche	roseo con bordi bianchi	rosa pallido, con raggi irregolari di rosa+carico e fasce di accrescimento ancor + colorate
<b>Tellina punicea</b>	Von Born, 1778		non Med.			
<b>Tellina pygmaea</b>	Löven, 1846	8-9.5	Med.	fragile, valva dx + convessa della sn, umbone nella parte posteriore. Superficie con linee concentriche	come ext	molto variabile: bianco, rosso con macchie o sfumature e anche zone radiali.
<b>Tellina serrata</b>	Brocchi, 1814	30-42	Med. coralligeno -10/-40 anche abissale	anteriamente +larga e arrotondata, poste + breve rostrata e tronca con bordo superiore carenata e linee concentriche che in parte vi sporgono, umbone piccolo e appuntato.		grigio azzurro se periostracato, oppure biancastro e nella parte superiore gialliccio
<b>Tellina tenuis</b>	da Costa, 1778	23 h. 15	Med. da pochi m. a zona interdittale	subquadrangolare, compressa, più o meno beante alle estremità. lieve carena o angolosità che va dalla sommità alla base della stroncatura posteriore. Dorsalmente appere incurvata posteroirmente	roseo uniforme	rosa vivo con zone concentriche più chiare
<b>Tellina valtonis</b>	Hanley, 1844		non Med.			