

Classis
Scaphopoda

Subclassis

Ordo

Stirps

Familia
Dentaliidae

86
Aa
02

Genus DENTALIUM Linnaeus, 1758
Subgenus ANTALIS H. & A. Adams, 1854



DENTALIUM (ANTALIS) VULGARE Da Costa, 1778

Principale sinonimia: *Dentalium tarentinum* Lk., 1818

	1	2	3	4	5	6	7
A	pars pag. 1263	pag. 3737 (fasciatum)		(D. tarenti- num Lk) vol. V pag. 345		vol. V pag. 398 (D. striola- tum)	
B		pag. 18 (D. tarenti- num Lk)	pag. 596 (D. tarenti- num Lk)		pag. 125 (D. tarenti- num Lk)		
C		pag. 195 (D. tarenti- num Lk)			p. 195 - v. III D. tarentinum p. 197 - v. V t. 55 - fig. 2	pag. 416 (D. tarenti- num Lk)	
D		pag. 48 (D. tarenti- num Lk)		pag. 28	pag. 42 (D. tarenti- num Lk)	pag. 20	pag. 16
E		pag. 31		pag. 558 vol. I tav. 66 fig. 1-6	pag. 356		
F		pag. 239 fig. 216		pag. 30	pag. 284		
G		pag. 61			pag. 88	pag. 509	
H							pag. 175
I	vol. II pag. 106 tav. 39 fig. 170	pag. 396 tav. 138					

ALTRE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

- PILSBRY H. A. & SHARP B., 1897-98: *Scaphopoda*, in Tryon's Man. Conch., Philadelphia, XVII, pagg. 41-42, tav. 8 figg. 22, 23, 24, tav. 9, figg. 53, 54.
STORK H. A., 1934: *Scaphopoda* der Adria - Thalassia, I, n. 9, Jena, pag. 8, fig. 8.
MARS P., 1947: Notes de Malacologie marine régionale - Bull. Muséum Hist. Nat. Marseille, VII, n. 2-3, pag. 99.
MUUS B. J., 1959: Skallus, søtaender, blaeksprutter - Danmark Fauna, 65, pag. 66, fig. 41.
CAPROTTI E., 1965: Notes on the Mediterranean *Dentaliidae* - Atti Soc. Ital. Scienze Naturali e Museo Civ. St. Nat. Milano, vol. CIV, fasc. III, pag. 347 e tav. 1, fig. 13.



Dentalium (Antalis) vulgare Da Costa

- 1 Es. del Mediterraneo gr. nat.
- 2 Es. di Viareggio gr. nat.
- 3 Es. di Viareggio gr. nat.
- 4 Es. di La Ciotat ingr. 2,5 x
- 5 *Dentalium (Antalis) entalis* L. (Inghilterra); ingr. 2,2 x

DIAGNOSI ORIGINALE: « *Dentalium laeve albescens. Vulgare.* » DA COSTA: British Conch., (1778), pag. 24, pl. 2, fig. 10.

DIAGNOSI: Conchiglia piuttosto solida e tozza, leggermente curvata. Colorazione: sub-trasparente o bianco-opaca, talora con zone rosate verso l'apice. Scultura longitudinale: circa 30 strie in zona apicale, che si obliterano sempre più verso l'apertura. Aperture a sezione circolare, senza fessura o intagli apicali. Talvolta si nota un'appendice tubolare interna all'apice.

OSSERVAZIONI: Questa specie fu in passato talora confusa con il *Dentalium entalis* L., che è specie esclusivamente atlantica e completamente liscia (fig. 5), mentre il *Dentalium vulgare* è minutamente striato verso l'apice (fig. 4). Gli esemplari mediterranei sono in genere meno tozzi di quelli atlantici.

DIMENSIONI: Lunghezza variabile in media fra 25 e 60 mm.

VARIETÀ: A solo titolo indicativo si citano: *attenuata*, *decurtata*, *zonulata*, *elongata*, *albina*, *citrina*, *gracilis*, tutte segnalate dal Monterosato, e *rosea* BDD.

PARTI MOLLI: Si veda la scheda del *Dentalium dentalis* L.

HABITAT: Vive a profondità comprese fra 1 e 50 metri, in fondi sabbiosi e fangosi.

ORIGINI E RINVENIMENTI FOSSILI: Probabilmente collegata con il pliocenico e miocenico *Dentalium vitreum* Schr., dal quale discenderebbe.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA: In tutto il Mediterraneo. Vive anche nell'Atlantico.

E. Caprotti - 1966